

Vitamulgol®

**Diät-Ergänzungsfuttermittel für verschiedene Tierarten
zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung**

**Aliment complémentaire liquide pour différentes
espèces animales pour un apport complémentaire
à court terme de vitamines**



AGRO
CHEMICA

Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitamin A und D3 nicht an Masttiere und nur entsprechend der Fütterungsempfehlung an die einzelnen Tierarten verfüttert werden!

Vor Gebrauch gut schütteln! Kühl (5 - 25 °C), frostfrei, trocken und lichtgeschützt lagern! Nach Anbruch schnellstmöglich aufbrauchen. Keine Haftung bei unsachgemäßer Behandlung oder Lagerung.

FR: Aliment diététique complémentaire (Toutes les espèces): Soutien de la préparation à l'oestrus et à la reproduction – Teneur élevée en vitamine A –

Composition: Glycérine, Dextrose, Bicarbonate de sodium, Chlorure de sodium

Ingrédients: Protéine brute 0,01 %, Matières grasses brutes 7,00 %, Cellulose brute 0,01 %, Cendres brutes 2,90 %, Humidité 57,00 %, Lysine 0,01 %, Méthionine 0,01 %, Sodium 1,10 %

Additifs par kg: Additifs nutritionnels: Vitamine A (3a672b) 18.000.000 U.I., Vitamine D (D3 (E671)) 200.000 U.I., Vitamine E (All-rac-alpha-tocophéryle acétate (3a700)) 19.600 mg, Vitamine C (Acide ascorbique (3a300)) 50.000 mg

Alimentation recommandée: Par jour et animal: 1 jument: 10 ml • 1 ovin reproducteur: 5 ml • 1 vache laitière: 10 ml • 100 poules pondeuses: 5 ml • 1 truie reproductrice: 2 ml • 1 lapin: 1 ml. – **Emploi:** Vitamulgol® peut être mélangé dans l'abreuvoir ou avec la ration alimentaire. Donner de préférence à l'état pur aux chevaux, bovins et moutons: à l'aide d'une cuillère ou d'un injecteur dosable (sans canule).

DE: Diät-Ergänzungsfuttermittel (Alle Tiere): Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion – Hoher Gehalt an Vitamin A –

Zusammensetzung: Glycerin, Traubenzucker, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid

Inhaltsstoffe: Rohprotein 0,01 %, Rohöl und -fette 7,00 %, Rohfaser 0,01 %, Rohasche 2,90 %, Feuchte 57,00 %, Lysin 0,01 %, Methionin 0,01 %, Natrium 1,10 %

Zusatzstoffe pro kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (3a672b) 18.000.000 I.E., Vitamin D (D3 (E671)) 200.000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700)) 19.600 mg, Vitamin C (Ascorbinsäure (3a300)) 50.000 mg

Fütterungsempfehlung: Pro Tier und Tag: 1 Stute: 10 ml • 1 Zuchtschaf: 5 ml • 1 Milchkuh: 10 ml • 100 Legehennen: 5 ml • 1 Zuchtsau: 2 ml • 1 Kaninchen: 1 ml.

Anwendung: Vitamulgol® kann in die Tränke oder das Futter eingemischt werden. An Pferde, Rinder und Schafe vorzugsweise pur verfüttern: Löffelweise oder mit Dosierspritze (ohne Kanüle) eingeben.

Fütterungshinweis: Vögel: Für weibliche Tiere: während des Östrus. Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität. Säugetiere: Kühe: Zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit. Sauen: 7 Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und 7 Tage vor bis drei Tage nach der Paarung. Sonstige weibliche Säugetiere: ab der letzten Phase der Trächtigkeit bis zur bestätigten nächsten Trächtigkeit. Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität. Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Futtermittels oder der Verlängerung der